

# *Protypusia striata*

Báez, 1982




ENDÉMICA

DIPTERA  
Bombyliidae



## DISTRIBUCIÓN



**Endémica de Canarias.**

Se distribuye principalmente por valles y zonas montañosas del interior.

## FENOLOGÍA



Ausencia

Abundancia  
media

Abundancia  
máxima



## IDENTIFICACIÓN

4 - 7 mm.

El cuerpo es compacto y escasamente recubierto de una pilosidad fina y amarillenta. La probóscide es relativamente larga, algo curvada hacia abajo y apuntando hacia delante. El tórax es robusto, gris, con tres franjas longitudinales negras, la central más ancha. El abdomen es bastante ancho en las hembras, más reducido en los machos, de color negro con estrechas bandas amarillentas en el borde de los terguitos. Los machos se diferencian además por tener los ojos unidos en la frente.



## PLANTAS VISITADAS

Está fuertemente especializada en *Asteraceae*, como *Glebionis*, *Asteriscus*, *Sonchus*, *Launaea* o *Calendula*.



## CICLO VITAL

Las larvas de los miembros del género *Protypusia* son ectoparasitoides de pupas de escarabajos de la familia *Tenebrionidae*.



*Protypusia striata* (hembra), en *Calendula arvensis*.

Foto: Gustavo Peña.



*Protypusia striata* (macho), en *Launaea arborescens*.

Foto: Gustavo Peña.