

Psilothrix viridicoerulea Geoffroy, 1785




INTRODUCIDA

COLEOPTERA
Melyridae



DISTRIBUCIÓN



Sur de Europa.

Introducida en Canarias. Se localiza en áreas de medianías de la vertiente norte de las islas.

FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia
media

Abundancia
máxima



IDENTIFICACIÓN

5-7 mm.

Destaca por su coloración uniformemente verde-azul metalizada. El cuerpo es alargado y estrecho, con el abdomen de lados paralelos, en los machos, y algo ensanchado en su mitad posterior, en las hembras. La superficie del tegumento es muy punteada y cubierta de pelos negros dispersos.



PLANTAS VISITADAS

Se encuentra preferentemente sobre Asteraceae, como *Galactites*, *Calendula*, *Andryala*, *Sonchus* o *Argyranthemum*, aunque también puede visitar plantas de otras familias, como *Convolvulus*, *Oxalis* o *Hirschfeldia*.



CICLO VITAL

Las larvas se desarrollan en el interior del tallo de diferentes plantas herbáceas. Presentan una sola generación anual. Inverna en estado de pupa dentro de los tallos secos y los adultos emergen al siguiente año.



Psilothrix viridicoerulea (hembra), en *Argyranthemum frutescens*.
Foto: Francisco Molina.



Psilothrix viridicoerulea (macho), en *Andryala pinnatifida*.
Foto: Domingo Sosa.