

Rhinia apicalis

Wiedemann, 1830




Mosca

NATIVA

DIPTERA
Rhiniidae



DISTRIBUCIÓN



África, sur de Asia y Oceanía.

En Canarias es una especie poco frecuente, que se distribuye principalmente por las zonas bajas.

FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia
media

Abundancia
máxima



IDENTIFICACIÓN

6 -8 mm.

Se caracteriza por su cara muy prominente y por los ojos verdosos, con rayas horizontales marrones. Destaca también el color anaranjado del abdomen y de las patas; el tórax presenta, en contraste, un brillo verde oscuro. Ambos sexos son muy similares, diferenciándose los machos por tener los ojos unidos en la frente.



PLANTAS VISITADAS

Tiene preferencia por Apiaceae, como *Astydamia* o *Foeniculum*, y por Asteraceae, como *Argyranthemum* o *Schizogyne*. También visita con frecuencia *Euphorbia*.



CICLO VITAL

La biología de esta especie es poco conocida, aunque se han encontrado sus larvas asociadas a nidos de avispas y de hormigas.



Rhinia apicalis (hembra), en *Euphorbia balsamifera*..
Foto: Gustavo Peña.



Rhinia apicalis (macho), en *Argyranthemum frutescens*.
Foto: Gustavo Peña.