

# *Scaeva pyrastris*

Linnaeus, 1758




Mosca

NATIVA

DIPTERA  
Syrphidae



## DISTRIBUCIÓN



## FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D



Europa, Asia y Norteamérica. Migratoria.

En Canarias puede encontrarse en todo tipo de ambientes, de costa a cumbre, siendo más frecuente en la vertiente norte de las islas.



## IDENTIFICACIÓN

10 - 15 mm.

Tiene aspecto vespoide, con el abdomen ancho y aplanado, de color negro, con tres pares de manchas blancas o amarillentas, estrechas y arqueadas en forma de coma, con el borde anterior bastánte cóncavo. La cabeza es grande, con la frente pronunciada; los ojos, de mayor tamaño en los machos, están cubiertos de cortos pelos blancos. El tórax es marrón oscuro y brillante, sin marcas distintivas, salvo los bordes laterales y el borde posterior del escutelo, anaranjados. Las patas son rojizas, con los fémures parcialmente negros.



## PLANTAS VISITADAS

Es especialmente atraída por Apiaceae, como *Astydamia*, *Foeniculum* o *Athamanta*. También visita habitualmente Brassicaceae, como *Hirschfeldia*, *Descurainia* o *Erysimum*, y Asteraceae, como *Sonchus*, *Argyranthemum*, *Reichardia* o *Pericallis*.



## CICLO VITAL

Las larvas viven sobre plantas de todo tipo, donde se alimentan de pulgones.



*Scaeva pyrastris* (hembra), en *Eruca sativa*.  
Foto: Gustavo Peña.



*Scaeva pyrastris* (macho), en *Hirschfeldia incana*.  
Foto: Gustavo Peña.