

Siphona seyrigi

Mesnil, 1960




ENDÉMICA

DIPTERA
Tachinidae



DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D



Endémica de Canarias.

En Canarias es más frecuente en medianías de la vertiente norte de las islas. En el sur, se localiza sobre todo en barrancos profundos.



IDENTIFICACIÓN

3 - 4 mm.

Destaca por su trompa muy larga y articulada, que en reposo se encuentra plegada y apuntando hacia delante. Las antenas son proporcionalmente largas, al igual que las patas, que son de color rojizo o anaranjado, con las rodillas y los tarsos oscuros. Los machos se diferencian fácilmente de las hembras porque los laterales del abdomen son anaranjados.



PLANTAS VISITADAS

Visita una amplia variedad de plantas, con predilección por Asteraceae, como *Argyranthemum*, *Sonchus*, *Pericallis* o *Calendula*. También es habitual en Brassicaceae, como *Crambe*, *Erysimum* o *Hirschfeldia*.



CICLO VITAL

Las especies del género *Siphona* parasitan larvas de polillas (Noctuidae, Geometridae) o de zancudos (Tipulidae).



Siphona seyrigi (hembra), en *Aeonium arboreum*.
Foto: Gustavo Peña.



Siphona seyrigi (macho), en *Pericallis lanata*.
Foto: Gustavo Peña.