

Spoladea recurvalis Fabricius, 1775




Mariposa

NATIVA

LEPIDOPTERA
Crambidae



DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia
media

Abundancia
máxima

Cosmopolita. Migratoria

En Canarias se localiza exclusivamente en las zonas costeras, a menudo en áreas degradadas. En años lluviosos, cuando se desarrolla abundante vegetación herbácea, puede encontrarse en grandes números.



IDENTIFICACIÓN

20 - 24 mm. (envergadura alar).

Las alas son de color marrón, con dos cortas bandas blancas en cada ala anterior, y una banda del mismo color en la zona media de cada ala posterior. Suele disponer las alas abiertas en tal ángulo que las bandas blancas centrales de ambos pares de alas coinciden, dando la apariencia de ser una sola, característica que hace inconfundible a esta especie.



PLANTAS VISITADAS

Las alas son de color marrón, con dos cortas bandas blancas en cada ala anterior, y una banda del mismo color en la zona media de cada ala posterior. Suele disponer las alas abiertas en tal ángulo que las bandas blancas centrales de ambos pares de alas coinciden, dando la apariencia de ser una sola, característica que hace inconfundible a esta especie.



CICLO VITAL

Las larvas se alimentan principalmente de plantas de los géneros *Beta*, *Amaranthus* o *Achyranthes*.



Spoladea recurvalis, en *Schizogyne sericea*. Foto: Gustavo Peña.



Spoladea recurvalis, en *Argyranthemum frutescens*.

Foto: Gustavo Peña.