

Thyridanthrax indigenus

Becker, 1908




Mosca

ENDÉMICA

DIPTERA
Bombyliidae



DISTRIBUCIÓN



Endémica de Canarias.

Se localiza preferentemente en las zonas costeras.

FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia
media

Abundancia
máxima



IDENTIFICACIÓN

7 - 11 mm.

Se caracteriza por tener la mitad anterior de las alas muy oscurecida, con la excepción de una serie de pequeñas ventanas transparentes. En la coloración del cuerpo sobresalen el collar de pelos rojizos y tres bandas transversales de pelos blancos, dos en el tórax y otra hacia la mitad del abdomen. Los machos se distinguen por tener la frente algo más estrecha.



PLANTAS VISITADAS

Es más habitual observarla posada en el suelo, visitando tan solo ocasionalmente las flores. Se han registrado visitas a *Argyranthemum*, *Glebionis*, *Euphorbia*, *Heliotropium* o *Limonium*.




CICLO VITAL

Las larvas de las especies del género *Thyridanthrax* se alimentan de huevos de saltamontes.



Thyridanthrax indigenus (hembra), en *Glebionis coronaria*.
Foto: Francisco Molina.



Thyridanthrax indigenus (macho), en *Argyranthemum frutescens*.
Foto: Gustavo Peña.