

Trupanea guimari

Becker, 1908




Mosca

NATIVA

DIPTERA
Tephritidae



DISTRIBUCIÓN



Norte de África y sur de la península Ibérica.

En Canarias se distribuye por las zonas bajas, sobre todo en la vertiente sur de las islas.

FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia
media

Abundancia
máxima



IDENTIFICACIÓN

3 mm.

Los dos tercios posteriores de las alas se encuentran casi completamente oscurecidos, salvo unas pocas manchas transparentes y la punta del ala. Los ojos son verdes e iridiscentes. El cuerpo se encuentra recubierto de pulverulencia grisácea, sin marcas distintivas. Las hembras poseen un corto oviscapto en el extremo del abdomen. En los machos, las manchas transparentes de las alas son más grandes.



PLANTAS VISITADAS

Se encuentra casi exclusivamente sobre las flores de *Launaea*, aunque a veces visitan otras plantas como *Euphorbia*.



CICLO VITAL

Las larvas se desarrollan en el interior de los capítulos florales de *Launaea arborescens*, consumiendo las semillas.



Trupanea guimari (hembra), en *Launaea arborescens*.
Foto: Gustavo Peña.



Trupanea guimari (macho), en *Euphorbia regis-jubae*.
Foto: Francisco Molina.