

Zeuxia aberrans

Loew, 1847




Mosca

NATIVA

DIPTERA
Tachinidae



DISTRIBUCIÓN



Norte de África y sur de Europa.

En Canarias es una especie poco frecuente, que se localiza fundamentalmente en las zonas bajas.

FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D



Ausencia



Abundancia
media



Abundancia
máxima



IDENTIFICACIÓN

9 -10 mm.

De coloración general gris oscura, con ligero brillo azulado, carece de marcas distintivas aparentes que ayuden a su identificación. La característica más fiable para distinguirla de otras moscas de tamaño y aspecto similar es la peculiar venación de las alas. El abdomen es corto, con forma cónica, y en los machos presenta sendos parches rojizos en los laterales, cerca de la base, difíciles de ver, y no siempre presentes. Aparte de esta última característica, los machos se diferencian por la frente más estrecha que las hembras.



PLANTAS VISITADAS

Muestra una clara predilección por Asteraceae, como *Argyranthemum*, *Asteriscus*, *Calendula* o *Glebionis*. En menor medida, visita plantas de otras familias, como *Euphorbia* o *Foeniculum*.



CICLO VITAL

Las larvas son parásitas de larvas de escarabajos, fundamentalmente del género *Deroplia* (Cerambycidae), aunque también se ha comprobado que parasitan larvas de *Lixus* (Curculionidae).



Zeuxia aberrans (hembra), en *Argyranthemum frutescens*.
Foto: Gustavo Peña.



Zeuxia aberrans (macho), en *Argyranthemum frutescens*.
Foto: Gustavo Peña.