

Acmaeodera cisti

Wollaston, 1862




ENDÉMICA

COLEOPTERA
Buprestidae



DISTRIBUCIÓN



Endémica de Canarias.

Es especialmente frecuente en áreas forestales de medianías y zonas altas.

FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D



IDENTIFICACIÓN

6 - 9 mm.

Se caracteriza por su cuerpo en forma de bala, alargado, cilíndrico y con el abdomen terminado en punta. Tienen una coloración de fondo marrón oscura, con cierto brillo metálico. Los élitros están decorados por multitud de pequeñas marcas anaranjadas o amarillas. Las hembras son más grandes y robustas que los machos. Se conocen seis especies del género *Acmaeodera* en Canarias, muy similares entre sí, por lo que pueden ser confundidas.



PLANTAS VISITADAS

Visita asiduamente Asteraceae, como *Argyranthemum*, *Pericallis*, *Sonchus* o *Carlina*. También es habitual en *Cistus*, *Adenocarpus*, *Cytisus*, *Aeonium* o *Pterocephalus*.



CICLO VITAL

Las larvas se alimentan de la madera de algunos arbustos, especialmente de leguminosas, como *Cytisus*, *Adenocarpus* o *Chamaecytisus*.



Acmaeodera cisti (hembra), en *Argyranthemum frutescens*.

Foto: Gustavo Peña.



Acmaeodera cisti (macho), en *Pericallis lanata*. Foto: Gustavo Peña.