

Corizus hyoscyami

Linnaeus, 1758




Chinche

NATIVA

HETEROPTERA
Rhopalidae



DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia
media

Abundancia
máxima

Norte de África, Europa y Asia.

En Canarias se encuentra la ssp. *nigradorsum*, que se distribuye por el norte de África y el sur de Europa. Es más frecuente en medianías y zonas altas, aunque ocasionalmente puede encontrarse en áreas costeras.



IDENTIFICACIÓN

9 - 10 mm.

Se distingue de otras chinches de aspecto similar por tener el cuerpo recubierto de largos pelos amarillentos y por las numerosas venas que recorren la parte membranosa apical de los hemiólitos. Presenta un llamativo patrón de coloración rojo y negro, aunque hay ejemplares de coloración más pálida, amarillenta. Los machos tienen el abdomen más estrecho que las hembras, y muestran en su extremo una genitalia bien desarrollada.



PLANTAS VISITADAS

Por lo general se encuentra sobre Asteraceae, como *Argyranthemum*, *Sonchus*, *Calendula*, *Tolpis* o *Carduus*. También se han registrado observaciones en *Euphorbia* y en Lamiaceae, como *Origanum* o *Bystropogon*.



CICLO VITAL

Las ninfas se desarrollan normalmente sobre las mismas plantas herbáceas cuyas flores visitan los adultos, alimentándose de savia.



Corizus hyoscyami (hembra), en *Tolpis* sp. Foto: Gustavo Peña.



Corizus hyoscyami (macho), en *Argyranthemum frutescens*.
Foto: Gustavo Peña.